

**■ - BASF**

We create chemistry

# CABRIO® WG

## L'innovativo fungicida per gli agrumi

**Novità 2021: estensione su nuovi patogeni e colture**

**Elevata efficacia e persistenza**

**Facile da miscelare con insetticidi e concimi fogliari**

**Ottima selettività colturale**

**Forte resistenza al dilavamento**

**Breve intervallo di sicurezza (7 gg per tutti gli agrumi)**

**Formulazione WG pratica da utilizzare**

Posizionamento  
consigliato

**FINE FIORITURA /  
ALLEGAGIONE**

**AUTUNNO /  
PRE RACCOLTA**

Bottoni fiorali

Fioritura

Allegagione

Accrescimento  
dei frutti

Sviluppo  
dei frutti

Maturazione



# CABRIO® WG



FUNGICIDA DI COPERTURA CON ATTIVITÀ PREVENTIVA, PER LA DIFESA DALLE MALATTIE FUNGINE DI DIVERSE COLTURE FRUTTICOLE



## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
20 g di F500® puro (Pyraclostrobin)  
(pari a 200 g/kg)



## FORMULAZIONE

Granuli Idrodispersibili (WG)



## CLASSIFICAZIONE



ATTENZIONE



## REG. MIN. SALUTE

N° 16038 del 16-08-2016



## CONFEZIONE

Flacone



## IMBALLO

Cartone da 10 flaconi

## Caratteristiche

**CABRIO® WG** è un fungicida di copertura con attività preventiva a base di Pyraclostrobin, sostanza attiva appartenente al gruppo delle Strobilurine. Dopo l'applicazione è assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e transaminare. **CABRIO® WG** agisce nei confronti dei patogeni fungini bloccando la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione.

## Modalità d'uso

**CABRIO® WG** deve essere applicato preventivamente. Si consiglia di impiegarlo nelle fasi e nelle condizioni favorevoli agli attacchi fungini nell'ambito di un programma di difesa che preveda la miscela o l'alternanza con sostanze attive a diverso meccanismo di azione, rispettando il numero massimo di trattamenti indicati in etichetta.

## Avvertenze

**CABRIO® WG** è miscibile con i più comuni fungicidi e insetticidi. In caso di miscela con altri prodotti è buona prassi effettuare saggi preliminari di compatibilità su piccole superfici, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

| COLTURA   | PATOGENI  | DOSE (Kg/ha)        | EPOCA D'IMPIEGO   | N° MAX TRATTAMENTI ANNUI | INTERVALLO DI SICUREZZA (gg) |
|---|---|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| <b>AGRUMI</b><br>Tutti gli agrumi inclusi arance, mandarini, limoni, pompelmi, limette/lime | <b>Alternariosi</b><br><i>Alternaria spp.</i><br><b>Micosferella</b><br><i>Mycosphaerella citri</i><br><b>Marciume verde e azzurro</b><br><i>Penicillium digitatum e Penicillium italicum</i> | <b>0,75 - 1.125</b> | Da allungamento germogli fino alla maturazione dei frutti   | <b>4</b>                 | <b>7</b>                     |
| <b>KAKI</b>   | <b>Cercosporiosi</b><br><i>Mycosphaerella nawae</i>   | <b>0,5</b>          | Da comparsa delle foglie fino alla fine della fioritura   | <b>2</b>                 | <b>100</b>                   |
| <b>OLIVO</b><br>Olive da olio e da tavola   | <b>Occhio di Pavone</b><br><i>Spilocaea oleagina</i><br><b>Lebbra</b><br><i>Colletotrichum spp.</i>   | <b>0,5</b>          | Eeguire 1-2 trattamenti delle nuove foglie allo stadio di ingrossamento frutti (entro fine luglio)    | <b>2</b>                 | <b>100</b>                   |
| <b>PERO</b>   | <b>Ticchiolatura</b><br><i>Venturia pirina</i><br><b>Maculatura bruna</b><br><i>Stemphylium vesicarium</i>  | <b>0,5</b>          | Da orecchiette di topo fino alla maturazione dei frutti   | <b>3</b>                 | <b>21</b>                    |
| <b>DRUPACEE</b><br>Pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio                            | <b>Nerume delle drupacee</b><br><i>Cladosporium carpophilum</i>   | <b>0,25</b>         | durante il periodo che va dalla cascola dei frutti dopo la fioritura fino alla maturazione dei frutti | <b>2</b>                 | <b>14</b>                    |

AGROFARMACO REGISTRATO DAL MINISTERO: CABRIO® WG A BASE DI PIRACLOSTROBINA, N. REGISTRAZIONE 16038. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI ED I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.